

13-14, 名古屋.

- 5) 中塚友貴子, 条美智子, 藤本(中川)孝子, 木村真梨, 金子真利亜, 姫野榮志, 後藤博三, 嶋田豊, 柴原直利: 桂枝茯苓丸への大黃加味による腎障害進展抑制効果に関する検討. 第26回和漢医薬学会大会, 2009, 8, 29-30, 千葉.
- 6) 姫野榮志, 条美智子, 藤本(中川)孝子, 中塚友貴子, 木村真梨, 金子真利亜, 亀井貴志, 後藤博三, 嶋田豊, 柴原直利: ストレプトゾトシン糖尿病モデルラットの血小板活性化に対するサフラン水抽出エキスの効果. 第26回和漢医薬学会大会, 2009, 8, 29-30, 千葉.
- 7) 木村真梨, 中塚友貴子, 条美智子, 引網宏彰, 後藤博三, 嶋田豊, 柴原直利: 加圧負荷褥瘡モデルラットにおける帰耆建中湯の効果(第2報). 第26回和漢医薬学会大会, 2009, 8, 29-30, 千葉.
- 8) 中塚友貴子, 条美智子, 藤本孝子, 木村真梨, 金子真利亜, 姫野榮志, 亀井貴志, 後藤博三, 嶋田豊, 柴原直利: 桂枝茯苓丸への大黃加味による腎線維化マーカーに対する影響. 第27回和漢医薬学会大会, (2010), 8, 28-29, 京都.
- 9) 姫野榮志, 条美智子, 木村真梨, 金子真利亜, 中塚友貴子, 亀井貴志, 引網宏彰, 嶋田豊, 柴原直利: 漢方方剤煎液の保存・加温方法の相違が指標成分濃度に与える影響. 第27回和漢医薬学会大会, 2010, 8, 28-29, 京都.
- 10) 亀井貴志, 藤本孝子, 条美智子, 木村真梨, 金子真利亜, 後藤博三, 嶋田豊, 柴原直利: 食事誘発性糖尿病モデルラットに対する和漢薬の効果. 第27回和漢医薬学会大会, 2010, 8, 28-29, 京都.
- 11) 木村真梨, 金子真利亜, 条美智子, 引網宏彰, 後藤博三, 嶋田豊, 柴原直利: 加圧負荷褥瘡モデルラットにおける帰耆建中湯の効果(第3報). 第27回和漢医薬学会大会, 2010, 8, 28-29, 京都.
- 12) 木村真梨, 条美智子, 野上達也, 藤本誠, 引網宏彰, 後藤博三, 柴原直利, 嶋田豊: 加圧負荷褥瘡モデルラットにおける帰耆建中湯の効果(第4報). 第28回和漢医薬学会大会, 2011, 8, 27-28, 富山.